

毒

有毒植物に要注意

山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し、食べたことにより、**食中毒**が発生しています。
有毒植物による食中毒で、**死者も発生**しています。

食用の野草と確実に判断できない植物は

絶対に

**採らない！ 食べない！
売らない！ 人にあげない！**

- ⚠ 家庭菜園や畠などで、野菜と観賞植物と一緒に栽培するのはやめましょう。
- ⚠ 山菜に混じって有毒植物が生えていることがあります。山菜狩りなどをするときは、一本一本よく確認して採り、調理前にもう一度確認しましょう。

<食用と間違やすい有毒植物の例>

スイセン 及び スノーフレーク



スイセン



スノーフレーク
(スランスイセン)

【中毒症状】
食後30分以内で、吐き気、嘔吐、頭痛など。
(スイセンでは、恶心、下痢、流涎、発汗、昏睡、低体温などもある。)

【間違えやすい植物】
・ニラ など
(スイセンは、ノビルやタマネギにも間違われやすい)

バイケインウ




芽出し期のバイケインウ

【中毒症状】
嘔吐、下痢、手足のしびれ、めまいなどの症状が現れ、死亡することもある。

【間違えやすい植物】
・オオバギボウシ(ウルイ)、ギョウジャニンニクなど

イヌサフラン



【中毒症状】

嘔吐、下痢、皮膚の知覚減退、呼吸困難。
重症の場合は死亡することもある。

【間違えやすい植物】
(葉)
・ギョウジャニンニク
・ギボウシ と類似。
(球根)
・ジャガイモ
・タマネギ など

クワズイモ



クワズイモの根茎



クワズイモの葉

【中毒症状】
恶心、嘔吐、下痢、痺痺、皮膚炎など

【間違えやすい植物】
・サトイモ

野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！
見分けに迷ったら、食べないでください！

過去10年間の有毒植物による食中毒発生状況（平成23年～令和2年）

植物名	間違えやすい植物の例（「 自然毒のリスクプロファイル 」より）	事件数	患者数	死亡数
スイセン	ニラ、ノビル、タマネギ	62	207	1
ジャガイモ	※親芋で発芽しなかったイモ、光に当たって皮がうすい黄緑～緑色になったイモの表面の部分、芽が出てきたイモの芽及び付け根部分などは食べない。	18	285	0
チョウセンアサガオ	ゴボウ、オクラ、モロヘイヤ、アシタバ、ゴマ	13	36	0
バイケイソウ	オオバギボウシ、ギョウジャニンニク	18	40	0
クワズイモ	サトイモ	17	40	0
イヌサフラン	ギボウシ、ギョウジャニンニク、ジャガイモ、タマネギ	17	24	10
トリカブト	ニリンソウ、モミジガサ	9	17	3
コバイケイソウ	オオバギボウシ、ギョウジャニンニク	4	9	0
ヨウシュヤマゴボウ	ヤマゴボウ	4	4	0
観賞用ヒヨウタン	ヒヨウタン	3	20	0
ハシリドコロ	フキノトウ、ギボウシ	3	8	0
キダチタバコ	カラシナ、カラシ	1	3	0
ユウガオ	ヒヨウタン、※まれに高ククルビタシン含量のユウガオによる中毒もある。苦みの強いものは摂食しない方がよい。	3	9	0
スノーフレーク	ニラ	2	5	0
ヒガンバナ	ニラ、ノビル、タマネギ	1	2	0
タガラシ	セリ	1	1	0
その他（ タマスダレ 、 ヒメザゼンソウ 等）		9	58	0
不明		5	25	0
合計		190	793	14

自然毒のリスクプロファイル

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/poison/index.html

- 毒キノコにも、ご注意ください！
→ [毒キノコによる食中毒に注意しましょう](#)
- 代表的な有毒植物及び毒キノコの特徴については
→ [「自然毒のリスクプロファイル」をご覧ください。](#)
- 一部地域で、**山菜**から基準値を超える放射性物質が検出されています。
→ 山菜狩りをする場合は、
[放射性物質のモニタリング検査結果や出荷制限などの情報](#)
をホームページ等で、確認してください。
→ 林野庁ホームページ「[山菜採取にあたっての留意点](#)」

おじいちゃん、おばあちゃん、食べないで！



それ、有毒植物ですよ!!


高齢者の方が、有毒植物を山菜などと間違って
食べて、死亡する事案が発生しています。




年代別にみた有毒植物※による食中毒患者数・死者数（2016～2020年）

※キノコとジャガイモを除く

患者数



死者数



食用と確実に判断できない植物は
採らない！食べない！
売らない！人にあげない！

絶対に

- 家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物と一緒に栽培するのはやめましょう！
- 有毒植物が山菜に混じっていることがあります。食用と確実に判断できない植物を食べるのはやめましょう！
- 食用の植物だと思っても、植えた覚えのない植物を食べるのはやめましょう！



野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！

毒

食べないでください!

— 食用と間違えやすい有毒植物の例 —

毒

スイセンおよびスノーフレーク



スイセン

スノーフレーク
スノーフレーク
スイセン

【中毒症状】

食後30分以内で、吐き気、嘔吐（おうと）、頭痛など。（※スイセンでは、恶心、下痢、流涎（りゅうせん）、発汗、昏睡、低体温などもあります）

【間違えやすい植物】

- ニラ など（※スイセンは、ノビルやタマネギとも間違えやすいので、特にご注意ください）

イヌサフラン

葉
球根

【中毒症状】

嘔吐（おうと）、下痢、皮膚の知覚減退、呼吸困難。重症の場合は死亡することもあります。

【間違えやすい植物】

- 《葉》・ギョウジヤニンニク
- ・ギボウシ と類似。
- 《球根》・ジャガイモ
- ・タマネギ など

バイケイソウ

芽出し期
のバイ
ケイソウ芽出し期
のコバイ
ケイソウ

【中毒症状】

嘔吐（おうと）、下痢、手足のしびれ、めまいなどの症状が現れ、死亡することもあります。

【間違えやすい植物】

- オオバギボウシ（ウルイ）
- ・ギョウジヤニンニクなど

グロリオサ



【中毒症状】

口腔・咽頭灼熱感、発熱、嘔吐（おうと）、下痢、背部疼痛などが発症し、臓器の機能不全などにより、死亡することもあります。

【間違えやすい植物】

- 《根》・ヤマイモ

チョウセンアサガオ

アサ
ガオの
葉と花アサ
ガオの
種

【中毒症状】

口の渴き、瞳孔の散大、意識混濁、興奮、麻痺、心拍数の増加 など

【間違えやすい植物】

- 《葉》・モロヘイヤ
- ・アシタバ
- 《根》・ゴボウ
- 《種》・ゴマ など

トリカブト



【中毒症状】

食後10~20分以内で、口唇、舌、手足のしびれ、嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、不整脈、血圧低下、けいれん、呼吸不全に至って死亡することもあります。

【間違えやすい植物】

- ニリンソウ
- ・モミジガサ など

・代表的な有毒植物の特徴は「自然毒のリスクプロファイル」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/poison/index.html